

LÍNEA DE BASE:

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP)

Proyecto Acción Comunitaria frente al Zika (CAZ)

Cifras Clave

1,696
Mujeres en edad reproductiva encuestadas

285
Encuestador@s

205
Entrevistas a profundidad

360
Barrios encuestados

5
Países que aplicaron las encuestas:
Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana

Conocimientos

Las encuestadas respondieron que el virus del Zika se transmite a través de:

76.4%
Picaduras de mosquitos




11.8%
Transmisión sexual



7.8%
Madre a hijo durante el embarazo




También dijeron que el Zika puede causar lo siguiente en recién nacidos:



31.7%
Malformación de la cabeza



16.2%
Muerte
(notar: no se tienen indicaciones de que el Zika cause muerte en los recién nacidos)



33.3%
No sabe


Menos del 20% de las mujeres encuestadas saben que el virus puede ser transmitido por vía sexual

Solo el 23% de mujeres embarazadas reportan haber recibido información sobre el Zika durante sus controles prenatales, aunque el 80% asisten a estos de forma regular

Hay poco conocimiento sobre el Síndrome Congénito relacionado asociado al Zika

Actitudes

Disposición a participar en sus comunidades:



Los condones se perciben principalmente como un anticonceptivo, no como una forma de prevenir el Zika


Prácticas

Únicamente **10.3%** están actualmente participando en actividades comunitarias

Medidas de protección personal:

34.6% Usan mosquiteros de noche

15.7% Usan mosquiteros de día



Canales de información preferidos

1 TV

2 Radio

3 Trabajadores de salud

76% Tienen acceso regular a redes sociales

